Preparaciones:

Para estudios de Abdomen y pelvis:

Dieta líquida el día anterior al estudio (Agua, Agua saborizada sin gas, Infusiones TE Mate, Sopas caldos colados sin arroz ni fideos, Gelatinas, Puré Amarillo)

Tomar 1 comprimido de Factor AG cada 12 hs desde el día anterior al estudio

Ayuno de 6hs el día del estudio, (si debiera tomar medicación puede hacerlo con agua, NO SE DEBE SUSPENDER LA MEDICACION)

Traer Estudios Anteriores **(Todos)**

Traer 1 ampolla de buscapina simple (Hioscina Butilbromuro)

Traer análisis de Creatinina y Uremia de no más de 30 días de realizado en caso de estar indicado el estudio con Inyección de Contraste (Gadolineo)

Para estudios de PELVIS ESPECIFICOS:

PELVIS FEMENINA (UTERO OVARIOS):

Dieta líquida el día anterior al estudio (Agua, Agua saborizada sin gas, Infusiones TE Mate, Sopas caldos colados sin arroz ni fideos, Gelatinas, Puré Amarillo)

Tomar 1 comprimido de Factor AG cada 12 hs desde el día anterior al estudio

Ayuno de 6hs el día del estudio, (si debiera tomar medicación puede hacerlo con agua, NO SE DEBE SUSPENDER LA MEDICACION)

Traer Estudios Anteriores **(Todos)**

Traer 1 ampolla de buscapina simple (Hioscina Butilbromuro)

Traer análisis de Creatinina y Uremia, de no más de 30 días de realizado en caso de estar indicado el estudio con Inyección de Contraste (Gadolineo)

TRAER TAMBIEN: Tampón para ser colocado al momento del día del estudio. Protector Femenino

PELVIS MASCULINA (PROSTATA-VEJIGA):

Dieta líquida el día anterior al estudio (Agua, Agua saborizada sin gas, Infusiones TE Mate, Sopas caldos colados sin arroz ni fideos, Gelatinas, Puré Amarillo)

Tomar 1 comprimido de Factor AG cada 12 hs desde el día anterior al estudio

Ayuno de 6hs el día del estudio, (si debiera tomar medicación puede hacerlo con agua, NO SE DEBE SUSPENDER LA MEDICACION)

Traer Estudios Anteriores **(Todos)**

Traer 1 ampolla de buscapina simple (Hioscina Butilbromuro)

Traer análisis de Creatinina y Uremia de no mas de 30 días de realizado en caso de estar indicado el estudio con Inyección de Contraste (Gadolineo)

PELVIS RECTO-ANO:

Dieta líquida el día anterior al estudio (Agua, Agua saborizada sin gas, Infusiones TE Mate, Sopas caldos colados sin arroz ni fideos, Gelatinas, Puré Amarillo)

Tomar 1 comprimido de Factor AG cada 12 hs desde el día anterior al estudio

Ayuno de 6hs el día del estudio, (si debiera tomar medicación puede hacerlo con agua, NO SE DEBE SUSPENDER LA MEDICACION)

Traer Estudios Anteriores **(Todos)**

Traer 1 ampolla de buscapina simple (Hioscina Butilbromuro)

Traer análisis de Creatinina y Uremia de no mas de 30 días de realizado en caso de estar indicado el estudio con Inyección de Contraste (Gadolineo)